



**STCCCV**

Société Tunisienne de Cardiologie  
& de Chirurgie Cardio-Vasculaire

---

## ECHOCARDIOGRAPHIE DE STRESS SOUS DOBUTAMINE

### FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE

---

Votre cardiologue a fait confiance à notre équipe pour la réalisation **d'une échocardiographie de stress sous DOBUTAMINE**. Cet examen recherche une atteinte de vos coronaires (artères nourricières de cœur), évalue une atteinte valvulaire et fait le bilan de votre muscle cardiaque.

#### **Déroulement de l'épreuve :**

La DOBUTAMINE est une substance naturelle stimulante qui augmente la puissance de contraction et la fréquence cardiaque. L'injection de la DOBUTAMINE se fera progressivement par palier à l'aide d'une seringue électrique (elle nécessite la mise en place d'un cathéter dans une veine de votre bras). Elle peut-être complétée par l'injection d'atropine pour arriver à votre fréquence maximale théorique (FMT) calculée par la formule suivante :  $FMT = 220 - \text{âge}$  (Exemple : patient de 57 ans :  $FMT = 220 - 57 = 163 \text{ bpm}$ ).

#### **Effets secondaires :**

##### DOBUTAMINE :

Ce produit dont l'activité principale est de reproduire un effort pour votre cœur aura les mêmes conséquences que lorsque vous faite une activité physique (palpitations, envie d'uriner, parfois essoufflements, nausées, tremblements, frissons). Ces effets disparaissent à l'arrêt de l'injection de DOBUTAMINE (2 minutes). Le suivi médical durant tout l'examen (écho, ECG) permet une détection très précoce de cette atteinte.



**STCCCV**

Société Tunisienne de Cardiologie  
& de Chirurgie Cardio-Vasculaire

Vous pouvez ressentir une douleur dans la poitrine qu'il faut signaler à l'équipe soignante, elle fait partie des signes de la maladie des coronaires. L'arrêt de l'injection permet le plus souvent la normalisation de ces effets secondaires, la durée d'action des produits utilisés étant très courte.

**ATROPINE :**

Les effets secondaires provisoires de ce médicament sont une sécheresse de bouche qui peut durer 1 à 2 heures après l'examen et des troubles mineurs de l'accommodation de l'œil. Il peut être contre-indiqué en cas de problème de prostate (difficulté d'uriner) ou de glaucome. Informez-en directement le médecin si vous souffrez de l'une ou l'autre de ces affections.

**SUIVI :**

Compte tenu de la survenue potentielle de ces effets, l'examen se déroule toujours en présence d'un, voire de deux médecins, associés à une infirmière formée pour ce genre d'épreuve. Cela permet de réaliser cette épreuve en toute sécurité. De plus, après l'examen, vous devrez rester sous contrôle médical pendant au moins ½ heure.

Merci de tenir à notre disposition votre traitement actuel.

**CONSENTEMENT**

J'ai été informé par le médecin cardiologue sur le déroulement de cet examen, des résultats escomptés ainsi que des effets secondaires qui peuvent survenir durant l'exécution du test. Le médecin responsable m'a expliqué le but et les risques de cette méthode. J'ai pu lui poser les questions utiles et il m'a apporté des réponses claires et satisfaisantes

Ce consentement est informatif et ne constitue pas une décharge de la responsabilité.

J'accepte que cet examen soit pratiqué sur ma personne.

Je n'accepte pas que cet examen soit pratiqué sur ma personne

**Date, nom et signature du patient**

**Signature du médecin**



**STCCCV**

Société Tunisienne de Cardiologie  
& de Chirurgie Cardio-Vasculaire